

Abse, Fistül, Toplam 3 Ameliyat (Yardıminız Rica)

Gönderen : gkngnr - 19/09/2014 00:51

Sayın Hocam,

Öncelikle bilgilerinizi ismini paylaşmamın çok doğru olmayacağını düşündüğüm bir medikal firma yetkilisinden aldığımı belirtmek isterim.

Yurtdışında yaşıyan, 39 yaşında bir kız kardeşim var. Hastanın şikayetini kendi ağzından raporluyorum. Biraz uzun olacak belki ama ilginize ve tecrübenize güvenerek desteğinizi rica ediyorum;

Merhaba

Adım x evli ve 4.5 aylık bir kız annesiyim. Su anda Avustralya'da ikamet ediyorum Türkiye'ye uçakla 17 saat mesafede. Bazi sağlık sorunları yaşamaktayım son 4 aydır. Arkadasım sizin benim hastalık sürecimi neden uzun sürdüğünü ve detayları bilmek istediğini ve size email atmamı istedi. Size kısa sorunların nasıl başladığını ve hangi mertebelerden geçtiğini listeleyeceğim.

Yardımcı olabilirsiniz sevinirim.

Sorun şöyle başladı. Bebegim hamileyken donmedigi için sezeryanla doğum yaptım. Normal doğumu denemedik bile. Hayatım boyunca kabız ya da ishal gibi problemim olmadı ya da tuvalete giderken veya tuvalet sonrasında sorunum olmadı. Bu sorunları hamilelik sırasında ya da doğumun hemen sonrasında da yaşamadım.

Bebegim 22 günlükken (20 Mayıs 2014) 40 derece ateş, kas ve eklem ağrılarıyla acil servise getirildim. Mastitis (göğüs enfeksiyonu) tanısı konuldu. Hastanede iken çok ağır ağrı kesiciler ve ilaçlar verildi. Ne yazık ki bu ağrı kesiciler kabızlık yapan türdendi ama bana bu ilaçların kabız yapabileceği söylenmediği gibi, bununla olacak bir ilaç hastanede de taburcu olurken de söylenmedi. Eve geldimde tuvalet ihtiyacım oldu. Diski çok sertti (bir kaya gibi) ve dışarı çıkmakta zorlandım. Butun sorunlar bu bir defalık tuvalet kabızlığıyla başladı.

Tuvaletten hemen sonraki gün çok dayanılmaz bir ağrı oldu ve alt tarafta bir şişme oldu. Oturmam, yürümem veya herhangi bir şey yapmam ağrı nedeniyle imkansızdı adeta inliyordum. Acil servise gittim morfinle ağrıyı kesip eve gönderdiler. İlacın etkisi geçince ağrı geri geldi. Gordüğüm doktor perianal kısmında enfeksiyon olduğunu söyledi. Bundan sonra su asamalardan geçtim.

1) Doktor eliyle orayı sikti ve antibiyotik verdi(kesik/cizik atmadan). Sikma işlemi 4 hafta boyunca her hafta devam etti antibiyotik eskiginde. 5. Haftada antibiyotik kullanımı ve sikma durduruldu fakat 6. Hafta ağrı ve iltihaplanma geri gelmeye başladı. 6. Hafta doktor acil servise sevk etti.

2) Acil serviste peri-anal abscess teshisi konuldu ve bir sonraki gün 9 July 2014 ameliyatla perianan abscess drain edildi. Yaklaşık 4 hafta içinde yara neredeyse kapandı ama iyileşmedi. Sürekli sarı renkli pus/discharge(akıntı) geliyordu bu 4 hafta içinde fakat hemşireler bunun normal olduğunu söyledi. Bunun üzerinden bir 4 hafta daha geçti ve bu süre içinde yara iyileşmedi sürekli üzerinde bir sivilce olup akıntı geldiğinde patlıyordu. Ayrıca tuvaletim geldiğinde alele acele kosturarak gitmem gerekiyordu yoksa camasırıma kaçabiliyordu. Bu birazda yaşadığım ağrılar kabız nedeni ile oluştüğundan tutarsam daha hasar veririm korkusu ile kaslarımlı kullanmadığımdan geldiği anda bırakıyor olmamdan da kaynaklanabilir pek emin değilim. Böylece iki aya yakın bir zaman geçti. Bu iki ay içinde ne zaman büyük tuvaletime gittiysem ameliyatin olduğu tarafta içerden acid dokulmuş gibi bir yanma ve ağrı

olup hafiflemesi bir kac saati aliyordu. Doctor fistula/sinus olabilecegini dusundu ve uzmana sevketti. Uzman MRI istedi. MRI'da fistula cikti.

3) 2 Eylul'de ikinci ameliyatimi olacagim kararlstirildi. Cerrah orda ufak bir abscess oldugunu on bosaltacagini ve bulabilirse fistula track'l bulacagini ve seton koyacagini ama fistulayi duzeltmeyecegini bunu bir sonraki ameliyatla yapacagini ve bunun zamalacagini soyledi. Nihayetinde ameliyat oldum. Abscess drain edildi, fistula track bulundu, seton takindi bir uc yaranin icinden, diger uc makattan disari geliyor yarayi acik tutmak icin Boylece drain edilmis olacakti. Ameliyattan sonra bu bahsettirm icerdeki sol tarafta amliyat tarafindaki asit gibi yanma ve agri oluyordu hastanede doctora bahsettigimde tissue hassas normal dedi. Fakat eve gelince amliyat sonrasi 6 gunlukken tuvalet sonrasi bu agri artmaya ve saatlerce hatta gun boyunca gecmemeye basladi. Ameliyat 12 gunlukken 14 Eylul 2014'de ani bir kanama geldi yaradan ve makattan. Acil serviste solugu aldim. Yardimci cerrah geldi abscess var dedi ve bir sonraki gun ameliyat etmeleri gerektiğini soyledi.

4) Boylece 15 Eylul'de ucuncu ameliyati oldum. Icerde buyuk bir abscess ve kan toplanmis. Onu bosalttilar. Seton hala daha icerde dokunmadilar fakat su anda kicimde ikinci bir kucuk delik var icinde drain dedikleri beyaz renkli bir plastic yumusak boru vardi. Onu bugun 18 September boru disari alindi. Seton hala icerde. Onlara ameliyatan cikinca nasil olur da orda bir abscess ve kan toplanmasi olabilir daha 12 gun once ameliyat oldum orda kucuk abscess vardi ve o alinmisti dedim. Cevap suydu.

Fistuladan bir dal olusmus ve bu uzanmis derinin altindan disari ve kucuk dal enfeksiyon yapmis. Nasil lur da bunu gormediler dedim 12 gun onceki ameliyatta ama bir cevap yok. Bu ucuncu ameliyatta abscessin ve dalin oldugu yeri tamamen oyup alabileceklerini fistulayida alabileceklerini ama tissuler hassas oldugundan ve makatta tuvaleti tutmaya yarayan kaslarin etrafinda oldugundan eger alirlarsa incontinence (diski kendiliginden srekli camasira geliyor, hasta hissetmiyor bile ve control edemiyor tuvaletini) sorunu acabilecegini buradaki kaslara zarar vererek dediler. Bu nedenle onu yapmadiklarini soylediler ve yapsaydilar orada buyuk bir oyuk ve yara olacakti. Bu denedikleri seyin calismasini umuyorlar ama tekrar enfeksiyon abscess yapmayacaginin garantisini vermiyorlar. Sorunumun oyle cbucak duzelecek bir sorun olmadigini ve zaman alacagini soylediler bu da eger her sey yolunda giderse.

Son durum bu.

Bu benim ilk cocugum ve cocugum 22 gunlukten beri agri icinde yataktayim. Popomun uzerine son 4.5 aydir oturamiyorum. Bu zaman zarfinda arada bazi bosluklar olmasina ragmen cogunlukla antibiyotik kullandim. Her gun bir mucadele gerek agri, gerek tuvalet sonrasi yara olan bolgenin temizleme guclugu, gerekse metabolizmanin ameliyatlari ve ilalac nedeniyle dengesinin degismesi hayatimi zorlastiriyor. Antibiyotik ishal yapiyor ya da bazen antibiyotik kullanmadigim zamanlar da ya kabiz olursam korkusu oluyor cunku bir iki kere oldum. Ne yiyip icecegimi sasirdim. Yedigim her seyi korkurak yiyorum kabiz ve ishal korkusu ile cunku ne kabiz ne de ishal fistula icin iyi degil. Ayrica tuvalet sonrasi temizligi cok sikintili ve zahmetli. Cok kilo kaybettim vucudumun gereken besini almadiindan ve iyice zayif duseceginden korkuyorum.

Allah'imin beni bebegime ve esime bagislamasini, sagligima kavusturmasini diliyorum. Care ariyorum cunku bu 4.5 aydir cok cektim. Buradak doctorlarinve cerrahlarin iyi mi kotumu is yaptiklarindan emin degilim.

Onlara olan guvenim ve umudum azaldi. Ben Bati Avustralya'dayim ve burada toplam 6 colo-rectal cerrah var ve benim gorundugum devlet hastanesinde sadece 3 tanesi var.

Hastaligimin caresi varsa nedir ve nasil bir yontemdir. Maliyeti nedir Takdir ederseniz 3 kere ameliyat olduktan sonra dogru ve guvenilir ellere emanet etme istiyorum kendimi cunku makat hassas ve zahmetli bi bolge ve uzun suredir cektiğim acilar ve yasadiklarimiz cok zor. Bunalim da yasayiyorum ara ara bu

durum nedeni ile. Yavrum büyüyor ve ben bakamıyorum doğru düzgün çocuğum ellerin elinde. Durum benim, bebğim ve esim için zor her acıdan.

Fiziksel, duygusal ve manevi olarak.

Yardımlı edebilir misiniz?

=====