

Ameliyat Hakkında...

Gönderen : Serkan Açıköz - 25/06/2010 16:47

Hocam

Ben 19 yaşımdayım yaklaşık 2 senedir anal fissür sorunun var ve artık ameliyat olup kurtulmak istiyorum...

Doktora 1 kere gittim krem fitil falan verdi geçmedi,son zamanlar hariç fazla sıkıntıda yoktu.Doktora gitsem bana ameliyat diyecek biliyorum...

Şimdi bu ameliyat nasıl oluyor,zor mudur? Hastanede yatmam gerekiyormu...
Yaşımın bir sıkıntısı varmı..

Cvp:Ameliyat Hakkında...

Gönderen : DrTaviloglu - 27/06/2010 17:01

Size geçmiş olsun, öncelikle yaşıınız çok genç, zira 19 yaşında bir kişide direkt olarak ameliyat önermek yerine ameliyat öncesinde alınabilecek tüm tedbirler alınır, tedaviler düzenlenir ve şayet bunlar bir sonuç vermezse ameliyat düşünülür. Komplike olmayan makatta çatlak veya anal fissür vakalarında ameliyatsız tedavi uygulanabilir. Makatta çatlak veya anal fissür vakalarında: 1. Diyet düzenlemeleri: posa bırakan gıdalar ve günde 2 Lt gibi su tüketilmesi, acı, ekşi ve baharatlı gıdaların kısıtlanması 2. % 0.2'lik nitrogliserinli krem: ile makattaki çatlak üzerine masaj yapılması: iç makat kasını gevşetme etkisi vardır. Fazla miktarlarda kullanılmamalıdır, çünkü fazla miktarda kullanıldığında tansiyonu düşürerek baş ağrısı, baygınlık hissi, bulantı ve kusma gibi yakınmalar yapabilirler. Uygulama sırasında parmaktan emilme olasılığına karşın eldiven ile uygulama veya kalın bir tahta veya plastik çubuk yardımı ile uygulanması bu yan etkileri azaltabilir. 3. Kalsiyum kanal blokerleri: Nifedipin ve diltiazem gibi haplar aynı şekilde iç makat kasını gevşeterek çatlağı iyileşmesine katkı sağlayabilirler. 4. Botulinum toksini (Botoks): iç makat kasında geçici bir felç oluşturarak makattaki çatlağın iyileşmesine katkı sağlarlar. Makatta çatlak veya anal fissür vakalarında çatlak olan bölgenin iki yanına 40 ünite Botoks enjekte edilir. Makatta çatlak (anal fissür) için Botoks tedavisinin avantajları: 1. Makattaki çatlak ameliyatında sfinkterotomi adı verilen iç makat kasının kesilmesi işleminin gaz veya dışkı tutamama gibi yan etkilerinden kaçınmak için geçici felç yaratan Botoks uygulaması gündeme girmiştir. 2. Ameliyathane gerektirmez. 3. İşlem sonrasında günlük aktiviteye aynen devam edilir. Genellikle, makatta çatlak durumunda hastaların % 70-75'inde botoks tedavisi ile tam başarı, % 20'sinde kısmi başarı elde edilir. Makatta çatlak sorunu olan hastaların % 5-10'unda ise botoks tedavisi sonuç vermez. Makatta çatlak nedeni ile yapılan Botoks uygulamasından sonra, hastanın yakınmalarında 30 gün içinde bir düzelme olmazsa bazı hastalarda, ikinci bir seans yapmak gerekebilir. Şayet makatta çatlak nedeni ile yapılan Botoks uygulaması başarılı olmazsa arkasından cerrahi girişim veya ameliyat yapılabilir. Makatta çatlak için cerrahi tedavi, altta yatan sertleşmiş iyileşme dokusunun (nedbe veya skar) çıkartılmasını prensibine dayanan bir kısa süreli bir ameliyattır. Anal kanalı kontrol eden makat iç kasının bir kısmının çıkartılması, ağrı ve spazmin önler ve çatlağın iyileşmesine yardım eder. Ameliyat akşamında hasta ayağa kaldırılır, oturma banyosu yaptırılır ve yemek verilir. Ağrı sıklıkla birkaç gün içinde ortadan kalkar. Hasta ortalama 3-4 gün içinde işine geri dönebilir. Tam iyileşme ortalama 3 hafta içinde olur. Ancak, yara iyileşme sorunu olanlarda bu iyileşme süreci bazen 3 aya kadar uzayabilir. Bu tür durumlarda yara iyileşmesini hızlandıran bazı kremler kullanılmaktadır. Hastaların % 5'inde makatta çatlak ameliyata rağmen tekrarlayabilir. Bu tür bir durumda hasta için hangi yöntemin etkili olacağına bağırsak hastalıkları ile yoğun bir şekilde uğraşan bir Genel Cerrahi Uzmanı'nın (kolorektal cerrahi) karar vermesinde yarar

vardır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Uzmanı

=====