

Anal fissür ameliyatı sonrası oluşan meme

Gönderen : proctolog - 26/04/2010 01:57

Hocam merhaba.Bundan tam 33 gun once anal fissur ameliyatı oldum LİS yöntemiyle.Su zamana kadar da en ufak bir problemle karşılaşmadım.Fakat ameliyat sonrası orta boy da bir meme sahibi oldum.Doktorum anestol pomad ve proctolog krem kullanmamı ongordu(Hala kullanıyorum günde 1 defa,bırakmalımıyım?).Bu memenin geçici olduğunu, gecmesse ufak bir operasyonla alabileceğini söyledi.Bu memenin çıkması normalmidir? 2 haftadır kontrol ediyorum ilk zamanlarda elime gelen o memeden eser yok.Sorum şu; o memenin tekrar çıkma olasılığı varmıdır?Diyelim ki çıktı, bana bir rahatsızlık vermiyorsa aldırırmassam herhangi bir sorun teşkil eder mi?Hocam bir de kabız kalmamak için Osmolak şurubunu kullanıyorum bunu sürekli kullanmanın bir sakıncası varmıdır?Ve son olarak body/fitness yapmam ağırlık kaldırmam benim için bir sorun oluşturur mu?Biraz fazla soru oldu ama kusura bakmayın hocam.Hastalık zor bilirsiniz işte...TEŞEKKÜRLER(Hocam bunları doktoruna niye sormadın dersiniz ameliyatı askeriyede oldum, hava değişimi aldım ve askerliğimi bitirdim.Bu yüzden doktorumu tekrardan görme şansım olmadı.)

Size geçmiş olsun, tahmininiz ...

Gönderen : DrTaviloglu - 26/04/2010 09:18

Size geçmiş olsun, tahmininiz doğru web siteme üye olurkende belirtildiği gibi başka bir meslektaşımın ameliyat ettiği veya tedavisinde olan hasta grubuna ben etik kurallar gereği kesinlikle yanıt vermiyorum. Ancak, sizin 33 gün önce, askerlik göreviniz sırasında makat çatlağı (anal fissür) nedeniyle, lateral internal sfinkterotomi (LİS) ameliyatı ameliyatı olduğunuzu ve şu anda askerlik görevinizi bitirmiş olduğunuzu belirtmeniz nedeniyle, sorularınızı yanıtlayacağım. Öncelikle, makatta ele gelen memeniz konusunda yorum yapabilmem zor, zira bu basur (hemoroid) memesi de olabilir veya makat çatlağına ait nöbetçi meme (sentinel pile) dediğimiz meme de olabilir. Bu tür bir fikir ileri sürebilmek için muayene esastır, ancak, halen memenin elinize gelmemesi, işlerin yolunda olduğunun göstergesi bence. Ama sakın bunun bir daha olmayacağı hissine kapılmayın, özellikle ıkınma veya zorlanma (vücut geliştirme nedeniyle yük kaldırma vb.) sonucunda bunlar yeniden çıkabilir. Pomadı bırakma konusunda aynı şekilde muayene etmeden yorum yapılamaz. Osmolak şurup türündeki ilaçlar laksatif grubuna girer ve uzun süre kullanımında bağımlılık yaparlar, bunun yerine sitemde 'Bağırsak hastalıkları' bölümünde 'kabızlık' başlığı altında örnek beslenme şekline ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Uzmanı
www.makatkanamasi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.barsakcerrahisi.com
www.kabizlikvekanser.com
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv