

## apse

Gönderen : Ümiley - 01/04/2010 15:23

---

selam hocam

ben 24 yaşımdayım

vajinalın dışında apse oluştu çok ağrılar çektim yürüyemez hale geldim

acile gittik apsesiyi boşaltılar enjektörle

1 ay oldu boşaltılan apse yerim iyileşmedi

ne zaman iyileşir.doktora gitmem gerekirmi.cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden cvpınız için teşekkür ederim.

## Size geçmiş olsun, sizin sorun...

Gönderen : DrTaviloglu - 04/04/2010 13:08

---

Size geçmiş olsun, sizin sorunuz sıklıkla Bartholin apsesi adı verilen bir sorun veya nadiren ender yerleşimli makat apsesi (perianal apse) olabilir. Sizin ön planda bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'na ve onun önerisi olursa bir Genel Cerrahi Uzmanı'na başvurmanız uygun olur. Makat apsesi (perianal apse) ile ilgili bilgiler zaten yukarıda mevcuttur. Size ayrıca Bartholin apsesi ile bilgileri de ekledim.

Bartholin kisti, Bartholin bezinin tıkanması sonrasında oluşan bir sıvı birikintisidir ve iltihaplanması durumunda, Bartholin apsesi adını alır. Bartholin apsesi jinekolojik sorunların % 2'sini oluşturur. Sıklıkla 20-29 yaş arasındaki kadınlarda rastlanır ve hazne (vajina) kenarında (vulva bölgesi), bezelye büyüklüğünden yumurta büyüklüğüne kadar değişebilir. Sıklıkla bel soğukluğu (gonore), frengi (sifilis) hastalığı nedeniyle oluşur. Hazne (vajina) kenarında ağrılı bir şişlik ile kendini belli eder. Bu durumda sıklıkla bir enjektör ile boşaltılır ve antibiyotik tedavisi verilir, apse cerrahi yöntemle boşaltılır ve içeriye bir dren veya kateter (Word veya Foley kateteri) yerleştirilip 2-4 hafta kadar yerinde bırakılabilir. Kateter yerinde durduğu sürece, cinsel temastan kaçınmak gerekir. Bazı durumlarda bu kistler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından cerrahi yöntemle tamamen açık hale getirilir, lazer ile kesilir, alkol enjeksiyonu (skleroterapi) yapılır, veya cilde ağızlaştırılır (marsüpüalizasyon tekniği). Hastaların işlem sonrasında ılık su içine oturarak birkaç gün boyunca, oturma banyosu yapmalarında yarar vardır. Genellikle, 40 yaş üzerindeki hastalarda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Bartholin bezi kanserini (bir milyon kişide bir rastlanır) dışlamak için biopsi almayı tercih ederler. Bu tekniklerin tümünde hastalığın % 30 oranında tekrar oluşabileceğini (nüks) hatırla tutmakta yarar vardır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Korhan Taviloglu

Genel Cerrahi Uzmanı

www.genelcerrah.com

www.drtaaviloglu.tv

www.makattacatlak.com

www.hemoroidbilgisi.com

www.barsakcerrahisi.com