

Hemoroid

Gönderen : cemdalsuna - 17/01/2011 18:11

33 yıldır bu rahatsızlığı çekmekteyim.Kanama 1 yıl içerisinde 8 veya 10 geçmemektedir.Dışkılama sonrası makattan dışarıya çıkan memeler genelde 30 dk veya 60 dk arasında kaybolmaktadır.Dışkılama ishal derecesinde olduğu zaman çok nadiren de olsa kanama olmakta memelerin kaybolması daha uzun süreyi almaktadır.Genelde hergün belli saatte 1 defa wc ye çıkmaktayım.Yalnız en az 10-15 yıl öncesine kadar wc ye 4-5 günde bir çıkmaktaydım.Genelde dışkılama katı denecek seviyededir.Dışkılamanın katı ve az olması durumunda ağrı ve sancının daha az olmakta dışkılamanın ishal seviyesinde olması durumunda ağrı ve sancı daha fazla olmakta geçmiş yıllarda bununla ilgili ilaç,krem,fitil tedavisi uygulanmış olmasına rağmen geçici rahatlama olmuştur.Son birkaç yıldır rahatsızlığım daha hissedilir duruma gelmiştir.Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum.

Teşekkür ederim

Cvp:Hemoroid

Gönderen : admin - 17/01/2011 21:56

Makattan kanama, şişlik gibi sürekli tekrarlayan yakınmalarınız var. Makattan kanama: en sık basur (hemoroid) ve makat çatlağında (anal fissür) görülmekle birlikte; bağırsağın divertiküler hastalığı, bağırsak polipleri, bağırsak kanseri, iltihaplı (enfeksiyonlu) ishal, anjiodisplazi, makat fistülü (anal fistül, perianal fistül, anorektal fistül), iltihabi bağırsak hastalığı, iskemik kolit, radyasyon koliti, damar hastalıklarına bağlı kanamalar, kan sulandırıcı ilaç ve ağrı kesici ilaçlara bağlı olan kanamalar ve HIV virüsüne bağlı olan kanamalar varlığında görülebilir. Ayrıca, nadiren makat bölgesi yaralanmaları ve makattan cinsel ilişki (anal seks, ters ilişki) nedeniyledir. Makatta şişlik, morluk veya meme ele gelmesi birçok hastalıkta görülebilir. 1. Hemoroid veya basur hastalığında makat içinde veya dışında, yada hem makatın içi ve hemde dışında memeler olabilir. 2. Makatta çatlak durumunda nöbetçi meme adını verdiğimiz, hemoroid veya basur memelerinde olduğu gibi memeler olabilir. 3. Rektal polip adı verilen bağırsağın iyi huylu tümörlerinde de makatta şişlik ele gelebilir. 4. Makat sarkması (rektal prolapsus) makatın aşağıya doğru sarktığı durumlarda olabilir, kimi zaman hemoroid ile birlikte olabilir. 5. Makat fistülü veya apsesi; sıklıkla akıntı veya ağrılı şişlik ile birlikte olurlar. 6. Makat siğili (anal kondilom veya kondiloma akuminata) 7. Tümörler: makat bölgesini habis tümörlerinde de şişlikler ele gelir. Konu hakkında daha detaylı bilgiyi, danışmanlığını yaptığım www.hemoroiduzmani.com sitesinde bulabilirsiniz. Bu nedenle makattan kanama varlığında; doğru davranış, bir Genel Cerrahi Uzmanı'na (tercihen yoğun olarak Kolorektal Cerrahi ile uğraşan bir Genel Cerrah) başvurmak olmalıdır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu

Genel Cerrahi Uzmanı

www.genelcerrah.com

www.drtaviloglu.tv

www.barsakcerrahisi.com

www.hemoroidbilgisi.com

www.kanserbilgileri.net

www.kansercerrahisi.com

www.makatkanamasi.com

www.makattacatlak.com

www.hemoroiduzmani.com

www.hemoroidnedir.tv

=====