

Sigmoid Kolonda Polip

Gönderen : korikos - 12/04/2012 00:11

Korhan Hocam merhabalar

Ben Londradan yazıyorum size, 29 yasındayım. Son 6 yıldır konstipasyon olduğum dönemlerde tuvalete çıktığım zamanlarda taze kan olabiliyordu, bu durum 1-2 gün suruyor sonra diyetime posali gıdalar ekleyince geçiyordu. Yaklaşık 3 hafta önce bir colorectal cerraha görünmek istedim, kolon kanseriyle ilgili bir videoyu izledikten sonra. Fiziksel incelemede 4-5 tane fissur ve split gozuktu anuste, kanamaların sebebinin büyük ihtimalle bu fissurler olduğu söylendi. Yapılan protoskopi ve rigid sigmoidoskopide temiz çıktı. Abdominal incelemede temizdi. Yalnız doktor her ihtimale karşı bir de flexible sigmoidoskopi önerdi. Bu tetkik bugün yapıldı ve çok küçük, galiba 3-4mm civarında bir polip bulundu sigmoid kolonda ve polip çıkarıldı. Doktor bunun kanama yapmayacağını, asemptomatik olduğunu, tesadufen bulunmuş bir polip olduğunu söyledi

Simdi benim cevap aradığım 2 soru var

1- 29 yasinda ve ailesinde kolon kanseri ya da polip hikayesi bulunmayan bir insanin sigmoid kolonunda polip cikmasi ne kadar normaldir ya da hangi siklikla gorulur??

2- Doktor onumuzdeki haftalarda kolonoskopi yapılmasını önerdi, bunun sebebi ne olabilir, sizce yaptırmalı mıyım??

Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla

Cvp:Sigmoid Kolonda Polip

Gönderen : admin - 15/04/2012 17:55

Geçmiş olsun kabızlık (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kabizlik-konstipasyon.html>) ve makattan kanama (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makattan-kanama.html>) yakınmaları ile bağırsak kanserinden (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) endişe ederek İngiltere’de bir kolorektal cerraha (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kolorektal-cerrahi-ve-proktoloji.html>) başvurmuşsunuz. Yapılan muayenede sizde makatta çatlak (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-catlak-anal-fissur.html>) belirlenmiş ve önce rektoskopi ve ardından sigmoidoskopi uygulanmış. Yapılan sigmoidoskopi tetkikinde bağırsakta küçük (dimünitif) bir polip bulunarak size kolonoskopi tetkiki yapılması önerilmiş.

Sizin örneğiniz aslında Türkiye’de yaşayan hastalar için kitap gibi öğretici vasıfta bence. İngiltere’deki NHS sağlık sistemi maliyet etkinliği nedeni ile direkt olarak kolonoskopiye izin vermez. Makattan kan gelmesi durumunda olguların % 90’ına yakının kalın bağırsağın sol kesiminden geldiği bilindiği için sigmoidoskopi tetkiki ile kalın bağırsağın sadece sol kesimi incelenir. Kalın bağırsağında polip (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kalin-bagirsak-polipleri.html>) olan hastaların % 30’unda kalın bağırsağın farklı bölümlerinde yeni poliplerin çıkması beklenir, bu nedenle kalın bağırsağın diğer kesimlerinde de polip bulunması olasılığına karşın bu durumdaki hastalara kolonoskopi tetkiki

(<http://www.taviloglu.com/endoskopi/kolonoskopi.html>) önerilir. Ülkemizde rektoskopi (<http://www.taviloglu.com/endoskopi/rektoskopi.html>) ve sigmoidoskopi (<http://www.taviloglu.com/endoskopi/sigmoidoskopi.html>) daha seyrek ve kolonoskopi ise büyük çoğunlukla uygulanmaktadır.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Tavioloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
(0530) 326 06 96
www.taviloglu.com
www.facebook.com/drtaviloglu
www.twitter.com/DrTaviloglu
<http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu>
www.dailymotion.com/DrTaviloglu
www.youtube.com/drtaviloglu
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv
www.robotcerrahisi.com
www.safratasi.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.barsakcerrahisi.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.makatkanamasi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroiduzmani.com
www.hemoroidnedir.tv
www.dailymotion.com/hemoroiduzmani
www.youtube.com/hemoroiduzmani
<http://www.facebook.com/HemoroidUzmani>
<http://twitter.com/hemoroiduzmani>

=====