

Bağırsak kanseri

Gönderen : Hiy - 31/07/2014 17:53

Hocam. Ben 16 yaşımdayım. Bi kaç ay önce kabızlık ve ona bağlı zorlanma ve kanama oldu. Bi sertlik hissediliyordu makatın 1cm gibi içinde. Ama sonra kabızlık geçti rahatsızlığımda geçti. Hissedilen sertlik geçmemişti. Ama bu ay yine tekrarladı. Bazen ishalde olabiliyor. Bu ay kanama 1 kere oldu tuvaletten sonra tuvalet kaşısına bulaşan açık kırmızı pembe gibi renkli bi kandı. Makata dokunun a acıyo ve sertlik var hala. Kanser olabilirmi çok korkuyorum.

Cvp:Bağırsak kanseri

Gönderen : DrTaviloglu - 31/07/2014 18:07

Size geçmiş olsun, beş ay önceki mesajınızda da (http://www.taviloglu.com/forum/index.php?option=com_kunena&Itemid=21&func=view&catid=14&id=4136#4137) benzer sorunuza cevaben bir Genel Cerrahi Uzmanı'na (<http://www.taviloglu.com/genel-cerrahi/genel-cerrahi-tanitimi-ve-muayenede-dikkat-edilecek-noktalar.html>) muayene olmanızı önermiştim. Sizde hastalarımızın büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi, yakınmalarınızda biraz düzelme olduğunda sorununuzu unuttuğunuz anlaşıyor. Bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>), rektum kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/rektum-kanseri.html>) veya makat kanseri (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-kanseri.html>) tanısı alan hastaların % 90'ının, 50 yaş üzerinde olduğu belirlenmiştir. 2007 yılı ABD resmi istatistiklerine göre kalın bağırsak ve rektum kanserine yakalanma olasılığı her 100,000 kişide 52'dir. Yaşam boyu bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) ve rektum kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/rektum-kanseri.html>) gelişme riski % 5-6 olarak belirlenmiştir. Toplumda bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) gelişme riski, erkeklerde % 2.9 ve kadınlarda ise % 2.2 olarak belirlenmiştir. Genellikle, 40 yaştan sonra bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) riski artmaya başlar. Çok nadir olarak 40 yaş altında bağırsak kanserine rastlanmakta olup, bunlarda sıklıkla ailevi veya kalıtsal nedenler veya çok sayıda bağırsak polipleri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kalin-bagirsak-polipleri.html>) varlığı yada iltihabi bağırsak hastalığı (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/inflamatuvar-bagirsak-hastaligi-crohn-ulseratif-kolit-vb.html>) olduğu gözlenmektedir. Bağırsak kanseri (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/bagirsak-kanseri.html>) olgularının sadece % 0.1'i 20 yaştan genç, % 1.1'i de 20-34 yaş aralığında, % 4'ü 35-44 yaş aralığında ve % 13.4'ü 45-54 yaş aralığındadır. Sizin bir Genel Cerrahi Uzmanı'na (<http://www.taviloglu.com/genel-cerrahi/genel-cerrahi-tanitimi-ve-muayenede-dikkat-edilecek-noktalar.html>) muayene olmanız yararlı olacaktır.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Tavioloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
www.taviloglu.com
www.tavilogluproktoloji.com

www.facebook.com/drtaviloglu
www.twitter.com/DrTaviloglu
<http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu>
www.dailymotion.com/DrTaviloglu
www.youtube.com/drtaviloglu
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.kildonmesisikayeti.com
www.barsakcerrahisi.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroiduzmani.com
www.dailymotion.com/hemoroiduzmani
www.youtube.com/hemoroiduzmani
<http://www.facebook.com/HemoroidUzmani>
<http://twitter.com/hemoroiduzmani>

=====