

Perianal fistül kansere dönüşür mü?

Gönderen : Nilselen - 06/07/2017 23:16

Önunculikle merhaba 27 yasındayım bebekken perianal fistul geçirmişim sonra ben 19 yasındayken bu yine tekrarladi ameliyat oldum gecti neyazikki 7 sene sonra tekrarladi ocak ayında apsem olustu apse ameliyati oldum apseden fistule cevirdi 7 aydir fistlumden sari akinti geliyor bazen tikaniyor sıkıyorum akiyor rahatlıyorum ameliyat olmak için acele etmem gerekirmi ben onla yaşamaya alistim gunde 3.4 damla akiyor hep hijyen halindeyim ve oraya ufak pamuklu kumas koyuyorum kirkendikce degistiriyorum ameliyat olmazsam kansere donusurmu en gec nezaman ameliyat olmam gerek:S

Cvp:Perianal fistül kansere dönüşür mü?

Gönderen : DrTaviloglu - 08/07/2017 14:10

Makat fistülü (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-fistul-ve-makat-apsesi.html>) hastalığı çok uzun yıllar (yaklaşık 8-10 yıldan fazla) devam ederse, fistül (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-fistul-ve-makat-apsesi.html>) olan bölgede oluşan tahribat sonucu nadiren makat kanseri gelişebilir. Bu olgularda % 44 oranında kolloid kanser, % 34 oranında skuamöz kanser ve % 22 oranında adenokanser gelişir. Bundan dolayı oluşan şikayetler, öncelikle bir Genel Cerrahi Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Doktor kontrolü dışında, dost tavsiyesi ile geliş güzel kullanılan ilaçlar, hastalığın ilerlemesine neden olabilir.

Makat fistülü (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-fistul-ve-makat-apsesi.html>) sorunu olan nerede ise tüm hastaların ortak inancı ve mutsuzluğu, “ameliyata rağmen nasıl olsa tekrarlıyor” şeklindedir. Merak ettiğiniz “makat fistülü tedavi edilmezse ne sorunlar yaratır?” sorusuna gelince burada ana sorun, makat bölgesinde sürekli devam eden bir enfeksiyonun olmasıdır. Makat bölgesinde komplike olan makat fistüllerinin (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-fistul-ve-makat-apsesi.html>) seyrinde; makat apsesi ve Fournier gangreni (<http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/fournier-gangreni.html>) gelişmesinden endişe edilir. Ayrıca, kalın bağırsak içinde yer alan oksijensiz ortamda yaşayan (anaerob) ve oksijenli ortamda yaşayan (aerob) bakteriler (mikrop) sürekli vücutta barınıp, sağlıklı organlara damarlar yolu ile yayılabilirler. Bu nedenle makat fistüllerinin kendi haline bırakılması yerine çözüm sağlanması tercih edilir. Ancak, burada bilinmesi gereken gerçek, basit makat fistüllerinde % 2-10 olan nüks oranının, komplike makat fistüllerinde % 20'ye dek çıkabilmesidir. Yalnız kolorektal cerrahi ve proktoloji (<http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kolorektal-cerrahi-ve-proktoloji.html>) veya bağırsak ve makat hastalıkları tedavisi hizmet veren ve bu alandaki tüm ameliyatsız tedaviler ile ameliyatları gerçekleştiren ekibimizden yardım almak istemeniz durumunda randevu hattımızı (<http://www.taviloglu.com/iletisim.html>) arayabilirsiniz. Acil şifa dileğimizle.

Saygılar,

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Taviloğlu Proktoloji
Bağırsak ve makat hastalıkları tedavisi
www.taviloglu.com
www.tavilogluproktoloji.com
www.genelcerrah.com

www.drtaviloglu.tv

www.hemoroiduzmani.com

www.facebook.com/drtaviloglu

www.twitter.com/DrTaviloglu

<http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu>

<https://plus.google.com/101286043113581809324>

www.dailymotion.com/DrTaviloglu

www.youtube.com/drtaviloglu

www.dailymotion.com/hemoroiduzmani

www.youtube.com/hemoroiduzmani

<http://www.facebook.com/HemoroidUzmani>

=====