

rektal prolapsus ve longo yöntemi için ne dersiniz

Gönderen : Misafir181 - 06/02/2010 21:52

Doktor bey ben 36 yaşında bir erkeğim ve bankacı olduğumdan günümün büyük bir bölümüm oturarak geçiyor. Makatımda 6 aydan beri şişlik ve kanama şikayetleri vardı ve gittiğim doktor bana rektal prolapsus ve hemoroid teşhisi kodu ve Longo hemoroid ameliyatı önerdi, bende biraz ameliyattan çekiniyorum, ne önerirsiniz?

Cvp:rektal prolapsus ve longo yöntemi için ne dersiniz

Gönderen : DrTaviloglu - 07/02/2010 13:07

Geçmiş olsun, sizde hemoroid hastalığı ile birlikte rektal prolapsus sorunu olduğu anlaşılıyor ve genellikle bunun en iyi tedavisi Longo ameliyatı ile olur. Bende doktorunuzun kararına katılıyorum. Kalın bağırsağın makata yakın olan son bölümü yani rektum'un makattan dışarı sarkması veya fıtıklaşmasına 'rektal prolapsus' denir. Makat dışı tutma kasının zayıflaması sonucunda dışkı veya mukus adı verilen sümüksü sıvının gelmesi söz konusu olabilir. Her iki cinste de olabilmekle birlikte kadınlarda daha sıktır. Rektal prolapsus veya makat sarkması: yaşam boyu alışkanlık haline gelen uzun süreli ıkınma alışkanlığı, kadınlarda doğumlardan sonra, nadiren kalıtsal eğilim, yaşla birlikte bağların ve dışkı tutma kasının gevşemesi, çatı kemiği tabanının bozukluğu (pelvik taban disfonksiyonu) durumunda idrar kaçırma (üriner inkontinens) ve omurilik yaralanmalarında gelişebilir. Kanama ve makattan sarkma gibi belirtiler hem hemoroid (basur) ve hem de rektal prolapsus da aynıdır. Rektal prolapsus durumunda bağırsağın daha üst bir bölümü dışarı çıkarken, hemoroid hastalığında bağırsağın makata çok yakın olan bir bölümü dışarı fıtıklaşır. Rektal prolapsus (makat sarkması) tanısı: bu konuda uzman bir hekim hastanın sorgulamasını yaparken ve muayene sırasında çoğunlukla rektal prolapsus (makat sarkması) tanısını koyabilir. Bazen iç veya gizli rektal prolapsus (makat sarkması) durumlarında radyolojik bir inceleme tekniği olan video-defekografi yararlı olur. Bu görüntüleme yönteminde bağırsak hareketleri sırasında çeşitli görüntüler alınarak gizli makat sarkmaları görüntülenebilir. Makat etrafındaki kasların fonksiyonunu araştırmak için anorektal manometri çok yararlı bir araştırma yöntemidir. Rektal prolapsus (makat sarkması) uzun süren bir kabızlık sonrasında meydana gelmesine karşın, kabızlık düzeltilse bile sarkma durumu gerilemez. Bu durumun ameliyatla düzeltilmesi gerekir. Ameliyat karın içinden veya makat içinden yapılabilir. Karın içinden yapılan girişimde günümüzde seçkin yaklaşım laparoskopik onarımdır. Uygun girişim uygulandığında hastaların büyük bir bölümü bundan yarar görür. Başarıda dışkı tutma kasının durumu, sarkmanın iç veya dış olması önemlidir. Ameliyat sonrasında dışkı tutma kasının tekrar eski gücüne kavuşması 1 yıl kadar bir süre alabilir.

Saygılarımla,

www.hemoroidbilgisi.com

www.genelcerrah.com

www.drtaaviloglu.tv

www.barsakcerrahisi.com