

kıl dönmesi

Gönderen : barış - 20/03/2010 12:40

hocam ben şuan sofya tıp üniv. da ftr okuyorum ama martın25 inde ist.gelcem 17 günlüğüne tarbyada oturuyorum ben istinye devlet hastanesinde kuyruk sokumundan ameliuat oldum gerçi tam kapanmadı(bu arada ameliyatı ay önce oldum)çok az bir açıklık kaldı dktor bey o kapanır dedi. benim esas sorunum şimdi kasığımda birtane daha çıktı ama ben okuyorum ve sofyaya geri dönmemlazım bana alternatif ameliyat olurmu ve gün içinde birde ücreti ne acaba

Cvp:kıl dönmesi

Gönderen : DrTaviloglu - 20/03/2010 15:25

Sizin geçmişte bir kıl dönmesi (pilonidal sinüs) ameliyatı oldğunuz ancak bugüne dek yaranızın kapanmadığı (arada geçen süre belirsiz) ve şimdi de muhtemelen kasık bölgenizde kıl dönmesi (sinüs pilonidalis) sorunu belirlediği anlaşıyor. Kıl dönmesi tedavisinde ameliyata alternatif lokal tedavi yöntemleri de vardır. Kıl dönmesi apsesi durumunda halk arasında kara merhem diye bilinen pomadın (ham petrol özelliğindeki karışımın sülfürik asit ile muamele edilerek suda çözünür hale getirilmiş şekli) sürülmesinin etkili olduğu ancak soruna geçici bir çözüm ürettiği bilinmektedir. Kıl dönmesinin lokal tedavisinde en sık olarak gümüş nitrat ve fenol gibi kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu kimyasal maddeler fistül girişlerinden içeriye verilir ve bu işlemler ortalama 10-15 dakika içinde tamamlanır. Haftalık veya iki haftalık kontrollerle ortalama 4-6 hafta içinde iyileşme olması beklenir. Bazen lokal anestezi altında fistüller arasındaki ilişkileri kesmek gerekebilir. Uygun koşullarda deneyimli ellerde yapıldığında gayet olumlu sonuçlar alınabilmekte ve nüks etme yani tekrarlama şansı % 8-10 civarında olmaktadır. Hasta birkaç kez üst üste hekime yara bakımı amaçlı gitmelidir. Bazı cerrahlar hangi yöntemle tedavi edilirse edilsin, kıl dönmesi (pilonidal sinüs) hastalığının 40 yaştan sonra kendiliğinden gerileyeceğine inanırlar, bu nedenle komplike hastalık olmadıkça ameliyat önermezler. Son yıllarda bu görüşün destekçileri artmaktadır. Tüm dünyada doğal ilaçlar ve alternatif tedavilere karşı giderek artan bir eğilim içinde hastalarında alternatif tedavi yönünde talepleri giderek yoğunlaşmaktadır. Kıl dönmesi tedavisinde fenol ve gümüş nitrat; labirent dışında kaçmadığı sürece yan etki oluşturmaz, ancak labirent dışına kaçtığına birkaç gün içinde aynı yerde ağrı ve akıntı yaparsa da tedavisi lokal anestezi altında pansumanla sağlanır. Öncelikle, size kıl dönmesi için ameliyatsız tedavi yönteminin uygun olup olmadığını muayene etmeden karar verilemez. Bu tür bir girişimin ücreti ise işlemin büyüklüğüne göre değişeceğinden sabit değildir. Bu nedenle, bu tür sorularınız cevabı ancak muayene olmanız durumunda verilebilir.

Saygılarımla,

Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
www.kildonmesisikayeti.com
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv